

Chronische lijst van aandoeningen

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die in het verleden door de overheid is samengesteld.

Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Hieronder de lijst van aandoeningen waarvoor deze regelgeving geldt. Onder beperking ziet u wanneer er sprake is van een tijdslimiet en onder verwijzing betekent S specialist en VHA Vervolg via de huisarts.

| Chronische lijst pathologieën (indien niets vermeld onbeperkt) | Code | Beperking | Verwijzing | Andere voorwaarden |
|---|------|---------------|------------|---|
| Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie | 12 | | S | |
| Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius | 51 | | S | |
| Achillespeesruptuur, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Acromionresectie, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Alban Köhler, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Amputatie, status na operatie | 00 | | | |
| Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) | 73 | | S | |
| Aortaplastiek, postoperatieve fase | 68 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Apoplexie | 72 | | | |
| Arthrogryposis multiplex congenita | 12 | | S | |
| Artrodese, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Artroplastiek, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Artrotomie, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Astmatische bronchitis met COPD | 54 | | | stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD |
| Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel | 78 | | S | |

| | | | | |
|---|----|---------------|---------|---|
| Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening | 78 | | S | |
| Ataxie als gevolg van - CVA | 72 | | | |
| Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening | 74 | | S | |
| Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening | 78 | | S | |
| Bandlaesie, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling | 36 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Bekkeninstabiliteit, post partum | 89 | 3 mnd | | |
| Besnier Boeck, ziekte van met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis | 56 | | S | met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis |
| Brandwonden, status na | 39 | | | alleen bij littekenweefsel |
| Bronchiëctasieën met COPD | 54 | | | stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD |
| Brown-Séquard, syndroom van | 76 | | S | |
| Calvé-Legg-Perthes, ziekte van | 10 | | S | alleen bij patiënt < 22 jr |
| Capsulitis adhesiva (alleen van schouder) | 21 | 12 mnd | | |
| Capsulotomie, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Cerebellaire aandoeningen | 78 | | S | |
| Cerebellaire ataxie | 78 | | S | |
| Cerebral palsy/cerebrale parese | 71 | | S | |
| Cerebrovasculair accident (CVA) | 72 | | | |
| Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van | 78 | | S | |
| Chemonucleolyse, postoperatieve fase | 05 | | S+/VHA+ | |
| Chorea - extrapiramidaal | 74 | | S | |
| Chorea - ziekte van Huntington | 74 | | S | |
| Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | 54 | | | stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD |
| Chronische (astmatische) bronchitis met | 54 | | | stadium II of |

| | | | | |
|---|----|------------------|---------|--|
| COPD | | | | hoger van de Gold Classificatie voor COPD |
| Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval | 78 | | S | |
| Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine | 48 | 12 mnd | | Bij CZ bij start in 2013 alleen indien praktijk aangesloten is bij ClaudicatioNet |
| Collageenziekten | 94 | | S | |
| Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget | 14 | | S | |
| Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname | 36 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Congenitale dysplasie heup | 12 | | S | |
| Contractuur van Volkmann | 16 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd |
| Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling | 36 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling | 33 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Cystic fibrosis | 51 | | S | |
| Dermatomyositis | 94 | | S | |
| Diffuse interstitiële longaandoening | 56 | | S | met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis |
| Diplegia spastica | 71 | | S | |
| Duchenne, ziekte van | 78 | | S | |
| Dupuytren, postoperatieve fase | 08 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Dwarslaesie | 76 | | S | |
| Dystonieën, extremiteits- | 74 | | S | |
| Dystonieën, gegeneraliseerde | 74 | | S | |
| Dystrophia musculorum progressiva (DMP) | 78 | | S | |
| Dystrophia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert) | 78 | | S | |
| Elephantiasis (lymfoedeem) | 46 | | | |
| Emfyseem bij COPD | 54 | | | stadium II of |

hoger van de Gold
Classificatie voor
COPD

| | | | | |
|--|----|------------------|---------|-------------------|
| Endoprothese, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Epidermolysis bullosa met littekenweefsel | 95 | | | |
| Erbse parese/paralyse | 77 | | S | |
| Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën | 74 | | S | |
| Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - generaliseerde dystonieën | 74 | | S | |
| Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica | 74 | | S | |
| Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) | 78 | | S | |
| Fixatie wervels, postoperatieve fase | 05 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Forestier, ziekte van | 13 | | S | |
| Fractuur botten, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Fractuur ten gevolge van: - botmetastase | 14 | | S | |
| Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler | 14 | | S | |
| Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget | 14 | | S | |
| Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase | 05 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Fractuur, conservatief behandeld | 36 | 6 mnd | | |
| Friedreich, ataxie van | 78 | | S | |
| Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) | 21 | 12 mnd | | |
| Guillain-Barré, ziekte van | 70 | | S | |
| Haglund, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Handletsels met littekenweefsel van de huid | 99 | | | |
| Hartfalen en sprake van ziekenhuisopname (ALLEEN ACHMEA) | 40 | 12 mnd | | Alleen bij Achmea |
| Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN) | 78 | | S | |
| Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP) | 78 | | S | |
| Hernia nucleï pulposi (HNP) met | 75 | 3 mnd | S | |

| | | | |
|---|----|------------------|---|
| motorische uitval (a.g.v. radiculopathie) | | | |
| Hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase | 05 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n) | 77 | | S |
| Hersenstaminfarct | 72 | | |
| Hersentumor met parese(n)/paralyse(n) | 71 | | S |
| Heupdysplasie | 12 | | S |
| Huntington, ziekte van | 74 | | S |
| Hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier) | 13 | | S |
| Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson) | 74 | | S |
| Infantiele encephalitis/encefalopathie | 71 | | S |
| Intra-articulaire fractuur | 36 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Juveniele osteochondrose | 13 | | S alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar |
| Kaakfractuur, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Kahler ziekte van, alleen bij fractuur | 14 | | S |
| Klippel-Feil syndroom | 12 | | S |
| Klompvoet | 12 | | S |
| König (pandakplastiek), postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Kruisbandletsel, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Kruisbandplastiek, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Kruisbandruptuur, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Kyfoscoliose, aangeboren | 12 | | S |
| Kyfoscoliose, progressief | 11 | | S |
| Kystische fibrose | 51 | | S |
| Laminectomie, postoperatieve fase | 05 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Lateraal sclerose (LS) | 73 | | S |
| Limb-girdle dystrofie | 78 | | S |
| Littekenweefsel huid | 99 | | |
| Little, ziekte van (diplegia spastica) | 71 | | S |
| Longfibrose, indien tevens COPD | 54 | | stadium II of hoger van de Gold |

| | | | Classificatie voor COPD | |
|--|----|---------------|-------------------------|---|
| Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte | 94 | | S | |
| Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling | 32 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel | 46 | | | |
| McArdle (glycogenose type V) | 65 | | S | |
| Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase | 03 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Mixed connective tissue disease (MTCDD) | 94 | | S | |
| Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel | 79 | | S | alleen bij patiënten jonger dan 17 jaar |
| Mucoviscidosis | 51 | | S | |
| Multipel myeloom, alleen bij fractuur | 14 | | S | |
| Multipele fracturen, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Multipele sclerose (MS) | 73 | | S | |
| Myasthenia gravis | 70 | | S | |
| Myositis ossificans, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Neerplastiek, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Neurofibromatose type I met motorische uitval | 70 | | S | |
| Neurogene claudicatio | 78 | 3 mnd | S | |
| Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer | 77 | | S | |
| Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal | 77 | | S | |
| Osteogenesis imperfecta | 12 | | S | |
| Osteomyelitis, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Osteotomie, postoperatieve fase | 02 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Ostitis deformans, alleen bij fractuur | 14 | | S | |
| Overige chirurgie v/h bewegingsapparaat (incl. nieuwvormingen) | 09 | 12 mnd i.a.o. | S | Alleen bij Achmea en Menzis. Bij CZ wordt code |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---|
| | | | xx09 niet gebruikt. Hier wordt over het algemeen code xx68 gebruikt. Dit schriftelijk aangevragen, samen met een SMART omschreven behandelplan. |
| Paget ziekte van, alleen bij fractuur | 14 | S | |
| Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose | 51 | S | |
| Pandakplastiek, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ | |
| Paralysis agitans (ziekte van Parkinson) | 74 | S | |
| Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel | 71 | S | |
| Parese als gevolg van: - CVA | 72 | | |
| Parese als gevolg van: - hersenletsel | 77 | S | |
| Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening | 70 | S | |
| Parese als gevolg van: - tumor in hersenen of ruggemerg | 71 | S | |
| Parese als gevolg van: - ruggemergaandoening | 78 | S | |
| Parkinsonisme | 74 | S | Bij CZ bij start in 2013 alleen indien praktijk aangesloten is bij ParkinsonNet |
| Peestransplantatie, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ | |
| Peestranspositie, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ | |
| Perifere zenuwaandoening met motorische uitval | 70 | S | |
| Perthes, ziekte van Calvé-Legg-Perthes | 10 | S | alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar |
| Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten | 77 | S | |
| Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc. | 77 | S | |
| Plexus (brachialis) laesie met motorische | 77 | S | |

| | | | | |
|---|-----|------------------|---------|---|
| uitval, posttraumatisch | | | | |
| Poliomyelitis | 70 | | S | |
| Polymyositis | 94 | | S | |
| Polyneuropathie met parese(n) | 78 | | S | |
| Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n) | 78 | | S | |
| Post partum bekkeninstabiliteit | 89 | 3 mnd | | |
| Postpoliosyndroom | 70 | | S | |
| Posttraumatische dystrofie | 28 | | S | |
| Primaire ciliaire dyskinesie | 51 | | S | |
| Progressieve scoliose | 11 | | S | |
| Progressieve spierdystrofie (DMP) | 78 | | S | |
| Quervin, ziekte van, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Radiculair syndroom met motorische uitval | 75 | 3 mnd | S | |
| Reflex sympathetic dystrophia | 28 | | S | |
| Reflexdystrofie | 28 | | S | |
| Reiter syndroom/ ziekte van Reiter | 94 | | S | |
| Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op | div | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - amyotrofische lateraal sclerose (ALS) | 73 | | S | |
| Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - dwarslaesie | 76 | | S | |
| Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - lateraal sclerose | 73 | | S | |
| Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - poliomyelitis | 70 | | S | |
| Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - postpoliosyndroom | 70 | | S | |
| Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën | 78 | | S | |
| Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n) | 71 | | S | |
| Sarcoïdose | 56 | | S | met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis |
| Sarcoom | 69 | 24 mnd i.a.o. | | |
| Scheuermann, ziekte van | 13 | | S | alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar. |
| Sclerodermie | 96 | | S | |
| Scoliose congenitaal | 12 | | S | |

| | | | |
|---|----|---------------|---------|
| Spierdystrofie | 78 | | S |
| Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling | 33 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van | 78 | | S |
| Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie | 78 | | S |
| Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert) | 78 | | S |
| Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH) | 78 | | S |
| Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie | 78 | | S |
| Spierziekten, bijvoorbeeld - McArdle, ziekte van | 65 | | S |
| Spina bifida | 78 | | S |
| Spinale musculaire atrofieën | 73 | | S |
| Spinale spieratrofieën | 73 | | S |
| Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Spondylodese, postoperatieve fase | 05 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica) | 78 | | S |
| Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse) | 71 | | S |
| Südeckse atrofie/dystrofie | 28 | | S |
| Symfyoliolyse, post partum | 89 | 3 mnd | |
| Sympathische reflexdystrofie | 28 | | S |
| Synovectomie, postoperatieve fase | 03 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Syringomyelie | 73 | | S |
| Systemische lupus erythematoses (SLE) | 94 | | |
| Tabes dorsalis | 78 | | S |
| Tenolyse, postoperatieve fase | 04 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Torticollis spasmodica | 74 | | S |
| Total hip, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ |
| Total knee, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd | S+/VHA+ |

| | | | | |
|---|-----|------------------|---------|---|
| | | i.a.o. | | |
| Total shoulder, postoperatieve fase | 01 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen | 51 | | S | |
| Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel | 77 | | S | |
| Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg | 78 | | S | |
| Vasculaire claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine | 48 | 12 mnd | | |
| Verpleeghuisopname, aansluitend op | div | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Volkman, contractuur van | 16 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Weke-delen tumor | 69 | 24 mnd i.a.o. | | duur van de behandeling maximaal twee jaren in aansluiting op een bestraling. |
| Wervelfractuur als gevolg van - botmetastasen | 14 | | S | |
| Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Kahler | 14 | | S | |
| Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Paget | 14 | | S | |
| Wervelkanaalstenose met motorische uitval | 70 | 3 mnd | S | |
| Whiplash | 38 | 3-6 mnd | S | als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. |
| Zenuwlaesie met motorische uitval | 70 | | S | |
| Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase | 68 | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Ziekenhuisopname, aansluitend op div. | div | 12 mnd i.a.o. | S+/VHA+ | |
| Ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitval | 70 | | S | |



COLOFON